

Démission. — M. le D^r LE PILEUR (de Paris).

Don aux Collections. — M. L. BLEUSE fait don pour les Collections de la Société de l'un des types de *Sefrania Bleusei* Pic [COL. DERMESTIDAE].

Cet insecte remarquable, dont il a déjà été parlé dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, [1899], pp. 28 et 105, a été découvert par M. L. BLEUSE à Ain-Sefra (Sud Oranais) au mois de mai 1896; il paraît ne pas avoir été retrouvé depuis.

Le *Sefrania Bleusei* n'ayant jamais été figuré, M. le D^r René JEANNEL a bien voulu en donner le dessin, d'après le type offert à la Société par M. L. BLEUSE.

La longueur de l'insecte est de 3,5 mill., la figure ci-contre représente 6 environ grossi fois.



Fig. 1. — *Sefrania Bleusei* Pic.

Observations diverses.

Capture. — M. P. LESNE a récemment capturé (5 janvier) dans la forêt du Tannenwald, aux environs de Mulhouse (Alsace), deux remarquables et rares espèces hivernales, le *Boreus hiemalis* L. [NEVR., PANORPIDAE] et le *Chionea araneoides* Dalm. [DIPT., TIPULIDAE], qu'il a rencontrés, errant, comme à l'habitude, à la surface de la neige couvrant le sol. Le Tannenwald est un massif forestier essentiellement composé de Hêtres.

Communications.

Sur divers *Altisides* du Nord de l'Afrique avec description de plusieurs formes nouvelles [COL. CHRYSOMELIDAE]

par Maurice Pic.

Mantura Henoni Pic, var. *sparsepunctata*, n. var. — *Modice elongata*, *aereo-olivacea*, *thorace elytrisque diverse sut sparse punctatis*.

Un peu allongé, bronzé à vagues reflets olivacés, base des antennes, tibias et tarsi testacés; ponctuation du prothorax plus ou moins fortement écartée sur le disque, cet organe ayant, de chaque côté, un sillon

basal relativement long et bien distinct, bordé d'une carène nette; élytres à ponctuation en rangées un peu écartée.

Algérie : Fren dah (Pic).

Diffère de *Henoni* Pic par la ponctuation moins forte, ou plus écartée du dessus du corps, l'intervalle externe des élytres large et paraissant lisse, etc.

Chaetocnema bilunulata, var. **praescutellaris**, n. var. — *Nigro-subviridescens* aut *semi-aenea*, *elytris ad apicem late et ad basin breviter, pallido notatis*.

En plus de la macule apicale jaune des élytres, il se trouve de petites macules supplémentaires jaunes sur ces organes, dans le voisinage de l'écusson.

Égypte : LUXOR (FERRANTE in coll. FERRANTE et PIC).

Chaetocnema politu Abeille. — Cette espèce, petite et très convexe, subcylindrique, facilement reconnaissable à sa forme qui la fait ressembler tout à fait à certains *Mantura* Steph., a été capturée par feu DE VAULOGER à Chellala et Charef en Algérie et j'y rapporte encore un exemplaire de mes chasses à Tiaret.

Psylliodes inflata Reiche. — Cette espèce ne paraît pas rare dans le Nord de l'Afrique. Je l'ai capturée à Sfax et Bône, DE VAULOGER l'a recueillie aux environs de Biskra, à Charef, Tunis, etc.

Psylliodes hospes, var. **Leprieuri**, n. var. — *Nigro-viridescens, elytris testaceo-pallidis, pedibus testaceis, femoribus posticis pro parte brunnescentibus*.

Noir verdâtre métallique sur l'avant-corps avec les élytres d'un testacé pâle, le dessous du corps foncé, les pattes testacées avec les cuisses postérieures en partie rembrunies; tête et prothorax fortement ponctués; élytres à intervalles finement ponctués. Variété bien distincte par la coloration des élytres plus claire que la coloration normale.

Algérie : Bou Saada (LEPRIEUR in coll. PIC).

Psylliodes Lethierryi Allard. — Cette espèce qui semble rare a été capturée à Constantine par HÉNOX et figurait dans la collection TOURNIER comme provenant de Blidah.

Longitarsus Vaulogeri, n. sp. — *Nitens, subconvexus, nigro-metallicus, subconvexus, antennis ad basin pedibusque plus minusve rufes-*

centibus; thorace alutaceo et sparse punctato; elytris apice truncatis, sparse et minute punctatis, humeris nullis. — Tunisie.

Brillant et faiblement convexe, noir métallique avec la base des antennes et les pattes plus ou moins rousses et les cuisses, postérieures au moins, plus ou moins rembrunies. Tête à fond alutacé, marquée de quelques points irréguliers, à carène et gibbosités nettes; antennes longues, plus ou moins rousses à la base et foncées à l'extrémité; prothorax transversal, à fond alutacé plus ou moins distinctement et parsemé de points variables et irréguliers jamais très gros; élytres à épaules nulles, élargis faiblement vers le milieu, un peu rétrécis ensuite avec le sommet plus ou moins nettement tronqué, à ponctuation irrégulière variable, jamais forte; pygidium débordant plus ou moins les élytres; pattes rousses avec les cuisses, postérieures au moins, plus ou moins rembrunies ou obscurcies. Long. 1,6-2 mill.

Tunisie : Mactar (coll. DE VAULOGER > coll. PIC).

Ressemble beaucoup à *Bonnairei* Allard; d'une forme un peu moins convexe, avec les élytres tronqués, et non subarrondis au sommet, et d'une ponctuation différente. A cause de la troncature des élytres, cette nouveauté peut prendre place près de *truncatellus* WEISE, qui ne m'est pas connu en nature, ce dernier, d'après sa description, semble être différent, soit par sa coloration plus noire, soit par la forme peu convexe.

Longitarsus dorsalis F. — Cette espèce se capture çà et là en Algérie; je la possède de Tlemcen (L. BEDEL in coll. DE VAULOGER), Oran (DE VAULOGER) et des environs d'Alger (coll. LEPRIEUR).

Description de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie [LEP.]

par P. CHRÉTIEN.

1. **Fondoukia**, nov. gen. — Spiritrompe minuscule, non enroulée, non squameuse; front bombé, lisse; palpes labiaux grêles, ascendants, obliques; 3^e article défléchi, horizontal; antennes de la ♀ très finement pubescentes. Ailes supérieures à 10 nervures; 4 manquant; 2 près de l'angle, 3 et 5 un peu tigées, 10 tigée sur 8 et 9. Ailes inférieures à 7 nervures, 2 près de l'angle, 3 et 5 longuement tigées, 7 et 8 paraissant tigées.